

Följande forskningsfrågor handlar om vilka skattningsinstrument som användes när patienten självskattade sin smärta respektive när smärtan skattades av vårdpersonal.

Med självskattad smärta menas att patienten själv ska ha skattat sin smärta med hjälp av ett skattningsinstrument, men patienten behöver inte själv ha fyllt i det fysiska formuläret.

Frågorna 14a1 och 14a2 handlar om de skattningsinstrument som användes under de sista 3 dyggen (sista 72 timmarna) i livet.

Dygn 7    Dygn 6    Dygn 5    Dygn 4    **Dygn 3**    **Dygn 2**    **Dygn 1**  
Död

14a1a. Användes ett skattningsinstrument när **patienten självskattade** smärta vid något dokumenterat tillfälle under **de 3 sista dyggen** i livet?

- Ja
- Nej
- Vet ej

14a1b. Vilket/vilka skattningsinstrument användes? Kryssa i **alla** skattningsinstrument som användes under tidsperioden.

- VAS (Visual Analogue Scale)
- NRS (Numerical Rating Scale)
- VRS/VDS (Verbal Rating Scale/Verbal Descriptor Scale)
- IPOS (Integrated Patient care Outcome Scale)
- ESAS eller ESAS-r (Edmonton Symptom Assessment Scale eller  
Edmonton Symptom Assessment Scale reviderad)
- Annat instrument, fyll i nedan

14a2a. Användes ett skattningsinstrument när **vårdpersonalen (ej närstående) skattade** patientens smärta vid något dokumenterat tillfälle under **de 3 sista dyggen** i livet?

- Ja
- Nej
- Vet ej

14a2b. Vilket/vilka skattningsinstrument användes? Kryssa i **alla** skattningsinstrument som användes under tidsperioden.

- APS (Abbey Pain Scale)
- Doloplus 2
- SöS-stickan
- FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability scale)
- IPOS (Integrated Patient care Outcome Scale)
- ESAS eller ESAS-r (Edmonton Symptom Assessment Scale eller  
Edmonton Symptom Assessment Scale reviderad)
- Annat instrument, fyll i nedan

