

Kvartalets fråga intravenös vätska/näring Q2 2026

Användningen av intravenös vätska/näring i livets slutskede är vanligt förekommande men omtvistad då det finns bristande evidens vad gäller effekt och biverkningar.

Enligt data från Svenska palliativregistret ökar intravenöst dropp sista dygnet i livet risken för andnöd. Däremot är det inte känt hur dropp de tre sista dagarna i livet påverkar symtombilden och anledningen till dropp under denna tidigare period är också okänt.

1. Gavs intravenös vätska/näring inom 3 dygn från dödsögonblicket.

- Ja
- Nej
- Vet ej

Om ja, besvara följdfrågorna.

Om nej eller vet ej → enkäten klar.

2. Hur tätt inpå dödsfallet gavs intravenös vätska/näring?

- Patienten dog med dropp inkopplat
- Droppet avslutades inom 6 timmar från dödsögonblicket
- Droppet avslutades 7–24 timmar innan dödsögonblicket
- Droppet avslutades 25-48h innan dödsögonblicket
- Droppet avslutades 49-72h innan dödsögonblicket

3. Vilken typ av vätska gavs (*flera alternativ möjliga*)?

- Klara dropp
- Blod
- Vätska tillsammans med antibiotika eller annat läkemedel
- Parenteral nutrition

4. Anledning till intravenöst vätska/näring (*flera alternativ möjliga*)?

- Patienten kunde inte äta (t.ex. pga. sväljsvårigheter)
- Patienten kunde inte dricka
- Lågt blodtryck
- Uttorkning
- Infektion
- Kräkningar eller diarréer
- Elektrolytrubbning
- Närståendes önskemål
- Patientens önskemål



Svårt att avsluta pågående behandling

Ileus

Njursvikt

Oklart/vet ej

Annat _____