

Farmakologisk behandlingsstrategi vid illamående i livets slutskede

Kommer från:

Magtarmkanalen

Kemotriggerzonen

Balansorgan

Överordnade cerebrala
centra

Karaktär:

Intermittent, lindras
ofta av kräkning

Konstant, lindras inte av
kräkning

Rörelseutlöst

Orsaker:

*åtgärda om
möjligt

Ventrikelretention
gastrit/ulcus*
obstipation*, ascites*

Cancerbörda, toxiner
infektioner*, läkemedel
hyperkalcemi*

Nyinsatta
opioider
rörelse, yrsel

Intrakraniell tryckstegring
ångest*, svår smärta*
betingat illamående

Läkemedel:

Haloperidol 0,5-1 mg x 2	++	+++		
Metoklopramid 10 mg x 3	+++ (ej vid tarmobstruktion)			
Postafen 25 mg x 2 (Meklozin)			+++	++
Olanzapin 2,5-5 mg x 1		++	++	+
Betametason 4-8 mg x 1	+ (+++ vid tarmobstruktion)	+	+	+++
Ondansetron 4-8 mg x 2	+	+		
Oxazepam 10 mg x 2-3				++ (vid ångest)

+++ 1 hands val
++ 2 hands val
+ 3 hands val